



Federatie
**Medisch
Specialisten**

Kennisinstituut

Risico-inventarisatievragenlijst tuberculose en latente tuberculose-infectie voor kinderen

Risico-inventarisatievragenlijst voor de screening op tuberculose of latente tuberculose-infectie (LTBI), bedoeld voor pediatrische patiënten die immuunsuppressieve medicatie gaan krijgen.

Deze vragenlijst is ontwikkeld door de richtlijnwerkgroep Tuberculosescreening voorafgaand aan immuunsuppressieve medicatie. De vragenlijst is niet gevalideerd. Lees altijd de overwegingen en aanbevelingen van de betreffende richtlijnmodule voor nuances, eventuele afwijkende situaties en extra achtergrondinformatie.

| | | |
|---|--|--|
| Zijn patiënt of ouders geboren in landen waar meer (>50/100.000 – 200/100.000) of veel (>200/100,000) tuberculose voorkomt (zie landenlijst*)? | Nee | Ja / onbekend |
| Heeft patiënt of één van de huisgenoten ooit tuberculose of latente tuberculose-infectie gehad? | Nee | Ja / onbekend |
| Heeft patiënt, voor zover bekend, wel eens contact gehad met mensen met tuberculose? | Nee | Ja / onbekend |
| Is er bij de patiënt of in zijn omgeving (familie of school) ooit contact onderzoek gedaan naar tuberculose? | Nee | Ja / onbekend |
| Heeft patiënt gereisd naar of gewoond in landen waar meer (>50.000 – 200/100.000) of veel (>200/100,000) tuberculose voorkomt (zie landenlijst*)? | Nee | Ja / onbekend |
| Aanvullende vraag voor de interpretatie van de Tuberculinehuidtest (Mantoux test): Is patiënt gevaccineerd tegen tuberculose (BCG vaccinatie)? Ja / Nee / Onbekend | Alle vragen met 'Nee' beantwoord: Een Mantoux OF IGRA vóór start immuunsuppressieve medicatie. Wanneer negatief kan medicatie gestart worden. | Ten minste 1 vraag met 'Ja' beantwoord: doe een Mantoux én IGRA, en laat een X-thorax maken. Indien er aanwijzingen zijn voor tuberculose of LTBI, overleg met of verwijs naar een specialist op het gebied van tuberculose. |

* <https://www.kncvtbc.org/kb/5-1-landenlijst-reizigersadvies-bcg-vaccinatie-en-vervolgscreening/>

Indien op alle vragen negatief geantwoord kan worden (groen antwoord), wordt aanbevolen een tuberculinehuidtest (THT) óf IGRA te verrichten - bij BCG-gevaccineerde kinderen wordt een IGRA aangeraden. Indien de gebruikte test een negatieve uitslag heeft, kan gestart worden met immuunsuppressieve medicatie. Bij een positieve testuitslag: overleg met of verwijs naar een specialist op het gebied van tuberculose (meestal een kinderarts-infectioloog).

Wanneer de antwoorden afwijken van de antwoorden in de groene kaders: Laat een THT én IGRA plus X-thorax maken, waarna overlegd kan worden met of verwezen worden naar een specialist op het gebied van tuberculose.