

Consultkaart GBS-bacterie en de bevalling: wel of geen antibiotica gebruiken?

Bronnendocument

1. Richtlijn Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties (Adaptatie van de NICE-richtlijn) (2017)
2. Consensus van de projectgroep.
3. Farmacotherapeutisch kompas. Benzylpenicilline.
<https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/b/benzylpenicilline>.
Geraadpleegd op 16-10-18.
4. Tuppurainen N, Hallman M. Prevention of neonatal group B streptococcal disease: intrapartum detection and chemoprophylaxis of heavily colonized parturients. *Obstet Gynecol.* 1989 Apr;73(4):583-7. PubMed PMID: 2494620.

Wat is de kans dat uw kind een GBS-infectie krijgt als u draagster bent van de GBS-bacterie en geen risicofactoren heeft?

Geen antibiotica gebruiken

1

Wel antibiotica gebruiken

1, 4

Welke bijwerkingen kunt u krijgen van antibiotica? En welke bijwerkingen kan uw kind krijgen?

Geen antibiotica gebruiken

n.v.t.

Wel antibiotica gebruiken

3

Kan de bevalling thuis of in het ziekenhuis plaatsvinden?

Geen antibiotica gebruiken

2

Wel antibiotica gebruiken

2

Wat gebeurt er na de bevalling?

Geen antibiotica gebruiken

1, 2

Wel antibiotica gebruiken

1, 2

Kunt u borstvoeding geven als u de GBS-bacterie heeft?

Geen antibiotica gebruiken

1, 2

Wel antibiotica gebruiken

1, 2