

Erratum, behorende bij richtlijn Diagnostiek van Koemelkallergie bij Kinderen in Nederland, ten aanzien van de dosering Xyzal en Aerius

Wijzigingen of aanvullingen zijn afgedrukt in **vet**

Pag 134: voor de 2^e en 3^e lijn: Dosering Xyzal en Aerius

Xyzal (tablet 5 mg, drank 0,5 mg/ml)

< 1 jaar: 0,25 mg /kg/**dag** in 2 doses (off label)

1 - 2 jaar: 0,25 mg/kg/**dag** in 2 doses (off label)

2 – 6 jaar: 2,5 mg/dag in 2 doses

6 – 18 jaar: 5 mg/dag in 1 dosis

Aerius (tablet 2,5 mg, 5 mg, stroop 0,5 mg/ml)

< 1 jaar 1,25 mg/dag = 2,5 ml (off label) in 1 dosis

1-5 jaar: 1,25 mg/dag = 2,5 ml in 1 dosis

6-11 jaar: 2,5 mg/dag in 1 dosis

12-18 jaar 5 mg/dag in 1 dosis

Pag 138: voor de 1^e lijn

Xyzal (tablet 5 mg, drank 0,5 mg/ml)

< 1 jaar: 0,25 mg /kg/**dag** in 2 doses (off label)

1 - 2 jaar: 0,25 mg/kg/**dag** in 2 doses (off label)

2 – 6 jaar: 2,5 mg/**dag** in 2 doses

6 – 18 jaar: 5 mg/**dag** in 1 dosis

Aerius (tablet 5 mg, stroop 0,5 mg/ml)

< 1 jaar 1,25 mg/**dag in 1 dosis** = 2,5 ml (off label)

1-5 jaar: 1,25 mg/**dag in 1 dosis** = 2,5 ml

6-11 jaar: 2,5 mg/**dag in 1 dosis** = 5 ml

12-18 jaar 5 mg/**dag in 1 dosis** = 10 ml